

Durch Rauchen bedingte Todesfälle

Durch Rauchen bedingte Todesfälle bei Frauen

Stand: 2007

Von 100 im Jahr 2007 gestorbenen Frauen sind ... Todesfälle durch das Rauchen bedingt.



Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (2009) Tabakatlas Deutschland 2009, Steinkopff Verlag, Heidelberg, S. 40

Insgesamt waren im Jahr 2007 in Deutschland fast 110.000 Todesfälle auf das Rauchen zurückzuführen. Das bedeutet, dass etwa 13% aller Todesfälle durch das Rauchen bedingt sind.

Auch wenn sich der Tabakkonsum bei Frauen dem der Männer immer mehr angeglichen hat, so vergehen in der Regel einige Jahrzehnte, bis sich der Tabakkonsum in schweren Gesundheitsschäden bemerkbar macht und zu den typischen und häufig tödlichen Raucherkrankheiten wie u.a. Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen führt.

In Deutschland zeigen sich große regionale Unterschiede der tabakbedingten Mortalität: Die höchsten Anteile tabakbedingter Todesfälle sind bei Frauen in Berlin, Bremen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen zu finden.